

MY TIRZER

(替尔泊肽) 注射剂

仅供皮下注射使用
处方药
仅限在医疗专业人员指导下使用

成分 (COMPOSITION): 每瓶含替尔泊肽5mg.

药品剂型 (PHARMACEUTICAL FORM): Lyophilized powder for injection.

MY TIRZER (替尔泊肽) 是什么及其用途

替尔泊肽是一种处方注射药物，联合饮食控制和运动，用于改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。
替尔泊肽通过激活体内两种天然激素受体（GIP和GLP-1）发挥作用，可帮助：

- 在血糖升高时促进胰岛素分泌
- 抑制胰高血糖素分泌
- 延缓胃排空
- 降低食欲

用法与用量 (DOSAGE AND ADMINISTRATION):

推荐剂量

起始剂量为每周一次2.5mg，连续4周。如耐受良好，可增加至每周一次5mg。进一步剂量调整须由医疗专业人员根据临床反应及耐受性决定。**每周仅可给药一次。**

给药方法

仅用于皮下注射。可注射于腹部、大腿或上臂。可与或不与进餐同时使用。每次给药应轮换注射部位。

禁忌症 (CONTRAINDICATIONS):

以下患者禁用**MY TIRZER**

- 有甲状腺髓样癌（MTC）个人或家族史，或患有2型多发性内分泌肿瘤综合征（MEN 2）
- 1型糖尿病患者
- 有胰腺炎病史或严重胃肠疾病（包括胃轻瘫）
- 妊娠期或哺乳期妇女，或计划怀孕者
- 18岁以下儿童及青少年
- 严重肾功能或肝功能损害者
- 对替尔泊肽或本品任何成分已知过敏者
- 进食障碍或临床显著体重过轻者

与其他药物的相互作用:

MY TIRZER 不得与其他注射制剂在同一注射器中混合使用。

在使用替尔泊肽治疗期间，未经医疗专业人员批准，不得使用其他药物（包括非处方药、草药制品或保健品）。
包括但不限于：控制食欲药物、哮喘药、感冒药、咳嗽药、花粉症或鼻窦炎药物、水杨酸类药物（如阿司匹林）。

警告与注意事项:

与胰岛素或其他 GLP-1 或 GIP 受体激动剂合用可能增加低血糖风险，必须在严格医疗监督下进行。建议定期监测血糖控制及胃肠道耐受情况。

不良反应 (SIDE EFFECTS):

以下不良反应通常在剂量增加期间或之后出现。如发生以下情况，请立即就医。

常见不良反应	严重不良反应
- 恶心 - 呕吐 - 腹泻 - 便秘 - 腹胀 - 疲劳 - 头痛 - 注射部位反应（包括红斑和瘙痒）	- 疑似胰腺炎症状，包括持续性剧烈腹痛，并可能放射至背部 - 严重过敏反应征象，如面部、嘴唇、舌头或喉咙肿胀；呼吸困难；或广泛性皮疹 - 严重或持续性胃肠道症状，可能导致脱水 - 临床显著性心动过速或心悸

贮存条件 (STORAGE CONDITIONS):

- 冷藏保存（2°C – 8°C），**不得冷冻**。避光保存。
- 使用2mL 0.9%氯化钠注射液复溶后，冷藏保存并须在30天内使用。
- 不得超过建议储存期限使用。

有效期：请参阅外包装。

包装规格：每盒5瓶。

产品注册持有人:

 Wellnet Xolutions SDN. BHD.
(20231014782 (1508704-A))
23-2A, Jalan PJU 1/3B, Sunwaymas Commercial Centre,
47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

免责声明及法律声明:

本资料由Wellnet Xolutions Sdn Bhd提供，仅供专业参考之用，不能替代临床判断。处方医疗专业人员须对患者评估、治疗决策、剂量调整及疗效监测承担全部责任。因本产品的使用、储存、处理或给药所引起的任何不良后果、并发症或损害，Wellnet Xolutions Sdn Bhd概不负责。
仅可在合格医疗专业人员监督下使用。