

MY TIRZER

(Tirzepatide) Injection

For Subcutaneous Use Only
Prescription Medicine
For Use Under Healthcare Professionals Only

COMPOSITION: Each Pen contains Tirzepatide 10 mg.

PHARMACEUTICAL FORM: 2.4 ml cartridge.

What MY TIRZER (Tirzepatide) Is and What It Is Used For

Tirzepatide is a prescription injectable medicine used to help improve blood sugar control in adults with type 2 diabetes mellitus, together with diet and exercise.

Tirzepatide works by activating two natural hormone receptors in the body (GIP and GLP-1), which help:

- Increase insulin release when blood sugar is high
- Reduce glucagon secretion
- Slow stomach emptying
- Reduce appetite

DOSAGE AND ADMINISTRATION:

Recommended Dosage

Initiate treatment with 2.5 mg once weekly for 4 weeks. If tolerated, increase to 5 mg once weekly. Further dose adjustments must be determined by a healthcare professional based on clinical response and tolerability. **Do not administer more than once weekly.**

Method of Administration

For subcutaneous injection only. Inject into the abdomen, thigh, or upper arm. May be administered with or without meals. Rotate injection sites with each dose.

CONTRAINDICATIONS:

MY TIRZER is contraindicated in patients with:

- Personal or family history of medullary thyroid carcinoma (MTC) or Multiple Endocrine Neoplasia syndrome type 2 (MEN 2)
- Type 1 diabetes mellitus
- History of pancreatitis or severe gastrointestinal disease, including gastroparesis
- Pregnancy or breastfeeding, or women planning pregnancy
- Children and adolescents under 18 years of age
- Severe renal or hepatic impairment
- Known hypersensitivity to Tirzepatide or any component of the product
- Eating disorders or clinically significant underweight status

INTERACTION WITH OTHER MEDICAMENTS:

MY TIRZER must not be administered in combination with other injectable products in the same syringe. Do not use other medicinal products, including non-prescription medicines, herbal products, or supplements, during treatment with Tirzepatide unless approved by a healthcare professional. This includes, but is not limited to, medicines for appetite control, asthma, colds, cough, hay fever, sinus conditions, or salicylates (e.g. aspirin).

WARNINGS AND PRECAUTIONS:

Concomitant use with insulin or other GLP-1 or GIP receptor agonists may increase the risk of hypoglycaemia and should only be undertaken under strict medical supervision. Regular monitoring of glycaemic control and gastrointestinal tolerance is recommended.

SIDE EFFECTS:

These following adverse reactions are generally and commonly reported tend to occur during or after dose escalation. Seek immediate medical attention if any of the following occur.

Common Adverse Reactions	Serious Adverse Reactions
<ul style="list-style-type: none">• Nausea• Vomiting• Diarrhoea• Constipation• Abdominal distension• Fatigue• Headache• Injection-site reactions (including erythema and pruritus)	<ul style="list-style-type: none">• Symptoms suggestive of pancreatitis, including severe and persistent abdominal pain, which may radiate to the back.• Signs of a serious hypersensitivity reaction, such as swelling of the face, lips, tongue, or throat; difficulty breathing; or widespread rash.• Severe or persistent gastrointestinal symptoms that may lead to dehydration.• Clinically significant tachycardia or palpitations.

STORAGE CONDITIONS:

- Store refrigerated at 2°C to 8°C and use within 30 days.
- **Do not freeze.** Protect from light.
- Do not use beyond the recommended storage period.

SHELF LIFE: Please refer outer package.

PACK SIZE: Pack in box of 2 units.

PRODUCT REGISTRATION HOLDER:

 Wellnet Solutions SDN. BHD.
(20231014782 (1508704-A))

23-2A, Jalan PJU 1/3B, Sunwaymas Commercial Centre,
47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

DISCLAIMER AND LEGAL NOTICE:

This information is provided by Wellnet Solutions Sdn Bhd as a professional reference only and does not replace clinical judgment. The prescribing healthcare professional bears full responsibility for patient assessment, treatment decisions, dose adjustments, and monitoring of therapeutic outcomes. Wellnet Solutions Sdn Bhd shall not be held liable for any adverse outcomes, complications, or consequences arising from the use, storage, handling, or administration of this product. Use only under the supervision of a qualified healthcare professional.

MY TIRZER

Suntikan (Tirzepatide)

Untuk Kegunaan Subkutaneus Sahaja
Ubat Preskripsi
Untuk Digunakan Di Bawah Pengawasan Profesional Kesihatan Sahaja

KOMPOSISI: Setiap Pen mengandungi Tirzepatide 10 mg.

BENTUK FARMASEUTIKAL: Kartrij 2.4 ml.

Apakah MY TIRZER (Tirzepatide) dan Kegunaannya

Tirzepatide ialah ubat suntikan preskripsi yang digunakan bersama diet dan senaman untuk membantu meningkatkan kawalan gula darah dalam kalangan pesakit dewasa dengan diabetes mellitus jenis 2.

Tirzepatide bertindak dengan mengaktifkan dua reseptor hormon semula jadi dalam badan (GIP dan GLP-1) yang membantu:

- Meningkatkan rembesan insulin apabila gula darah tinggi
- Mengurangkan rembesan glucagon
- Melambatkan pengosongan gastrik
- Mengurangkan selera makan

DOS DAN CARA PEMBERIAN:

Dos Disyorkan

Mulakan rawatan dengan 2.5 mg sekali seminggu selama 4 minggu. Jika diterima dengan baik, tingkatkan kepada 5 mg sekali seminggu. Pelarasan dos selanjutnya mesti ditentukan oleh profesional kesihatan berdasarkan tindak balas klinikal dan toleransi pesakit. **Jangan berikan lebih daripada sekali seminggu.**

Kaedah Pemberian

Untuk suntikan subkutaneus sahaja. Suntik di bahagian abdomen, paha atau lengan atas. Boleh diberikan dengan atau tanpa makanan. Tukar lokasi suntikan setiap kali dos.

KONTRAIKASI:

MY TIRZER adalah kontraindikasi bagi pesakit dengan:

- Sejarah peribadi atau keluarga karsinoma tiroid medulari (MTC) atau Sindrom Neoplasia Endokrin Pelbagai Jenis 2 (MEN 2)
- Diabetes mellitus jenis 1
- Sejarah pankreatitis atau penyakit gastrousus yang teruk termasuk gastroparesis
- Wanita hamil atau menyusukan anak, atau yang merancang kehamilan
- Kanak-kanak dan remaja bawah 18 tahun
- Kerosakan buah pinggang atau hati yang teruk
- Hipersensitiviti terhadap Tirzepatide atau mana-mana komponen produk
- Gangguan pemakanan atau status kurang berat badan yang signifikan secara klinikal

INTERAKSI DENGAN UBAT LAIN:

MY TIRZER tidak boleh dicampur dengan produk suntikan lain dalam picagari yang sama. Jangan gunakan ubat lain termasuk ubat tanpa preskripsi, produk herba atau suplemen semasa rawatan kecuali diluluskan oleh profesional kesihatan. Ini termasuk ubat kawalan selera makan, asma, selsema, batuk, resdung, atau salisilat (contohnya aspirin).

AMARAN DAN LANGKAH BERJAGA-JAGA:

Penggunaan bersama insulin atau agonis reseptor GLP-1 atau GIP lain boleh meningkatkan risiko hipoglisemia dan mesti dilakukan di bawah pengawasan perubatan yang ketat. Pemantauan berkala kawalan glisemik dan toleransi gastrousus adalah disyorkan.

KESAN SAMPINGAN:

Kesan sampingan berikut lazim berlaku terutamanya semasa atau selepas peningkatan dos. Dapatkan rawatan perubatan segera jika berlaku:

Kesan Sampingan Biasa	Kesan Sampingan Serius
<ul style="list-style-type: none">• Loya• Muntah• Cirit-birit• Sembelit• Perut kembung• Keletihan• Sakit kepala• Reaksi di tempat suntikan (kemerahan dan gatal)	<ul style="list-style-type: none">• Gejala pankreatitis termasuk sakit perut teruk dan berterusan yang mungkin merebak ke belakang• Tanda reaksi hipersensitiviti serius seperti bengkak muka, bibir, lidah atau tekak; kesukaran bernafas; atau ruam meluas• Gejala gastrousus yang teruk atau berpanjangan yang boleh menyebabkan dehidrasi• Takikardia atau berdebar yang signifikan secara klinikal

SYARAT PENYIMPANAN:

- Simpan dalam peti sejuk pada suhu 2°C hingga 8°C dan gunakan dalam masa 30 hari.
- **Jangan bekukan.** Lindungi daripada cahaya.
- Jangan gunakan selepas tempoh penyimpanan yang disyorkan.

JANGKA HAYAT: Sila rujuk pada pembungkusan luar.

SAIZ PEMBUNGKUSAN: Dibungkus dalam kotak berisi 2 unit.

PEMEGANG PENDAFTARAN PRODUK:

 Wellnet Xolutions SDN. BHD.
(20231014782 (1508704-A))

23-2A, Jalan PJU 1/3B, Sunwaymas Commercial Centre,
47410 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

PENAFIAN DAN NOTIS UNDANG-UNDANG:

Maklumat ini disediakan oleh Wellnet Xolutions Sdn Bhd sebagai rujukan profesional sahaja dan tidak menggantikan pertimbangan klinikal. Profesional kesihatan yang memberi preskripsi bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penilaian pesakit, keputusan rawatan, pelarasan dos dan pemantauan hasil terapi. Wellnet Xolutions Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesan buruk atau komplikasi akibat penggunaan, penyimpanan, pengendalian atau pentadbiran produk ini. Gunakan hanya di bawah pengawasan profesional kesihatan yang berkecualan.